

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

世醫得效方卷九

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

總校官降調編修臣倉聖脈

校對官待詔臣胡士震

謄錄監生臣王鏐

欽定四庫全書

世醫得效方卷九

元 危亦林 撰

大方脈雜醫科

健忘

小定志圓治心氣不定五臟不足甚者憂憂愁愁不樂
忽忽喜忘朝差暮劇暮差朝發及因事有所大驚夢寐
不祥登高履險致神魂不安驚悸恐怯

菖蒲炒

遠志

去心薑汁
淹各二兩

茯苓

茯神

人參

各三兩

辰砂

一兩
為衣

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服五十圓米湯下一方去茯神名開心散每服二錢匕不以時服

菖蒲益智圓治喜忘恍惚破積聚止痛安神定志聰耳

明目

菖蒲炒

遠志

去心薑汁淹炒

川牛膝

酒浸

桔梗

炒

人參

各三兩
三分

桂心

三分

茯苓

一兩
三分

附子

一兩
炮去

膠皮

右為末煉蜜圓梧子大每服三十圓食前溫酒米湯

下

加味茯苓湯治痰迷心胞健忘失事言語如癡

人參

去蘆

半夏

湯洗

陳皮

去白一兩半

白茯苓

去皮一兩

粉草

五錢

益智

去殼

香附子

炒去毛各一兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片烏梅半箇同

煎不拘時溫服

朱雀圓治心神恍惚舉事多忘

方見心
恙類

虛煩

淡竹茹湯治心虛煩悶頭疼氣短內熱不解心中悶亂
及婦人產後心虛驚悸煩悶欲絕

麥門冬

去心

小麥

各二兩半

甘草

炙一兩

人參

白茯苓

各一兩半

半夏

湯洗七次二兩

右剉散每服四錢水二盞生薑七片棗子三枚淡竹

茹一塊如指大同煎食前服虛勞煩悶尤宜服之

溫膽湯治大病後虛煩不得眠此膽寒故也此藥主之
又治驚悸自汗觸事易驚

半夏

竹茹

枳實

麩炒去穰
各二兩

陳皮

三兩

甘草

炙一兩

茯苓

一兩半

人參

一兩

右剉散每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚煎食
前服未效加遠志去心薑汁炒北五味子各一兩酸
棗仁一兩蚌粉炒入

酸棗仁湯治霍亂吐下增劇虛勞煩擾奔氣在胸中不

得眠或發寒熱頭疼暈悶

酸棗仁

炒一兩
三分

人參

桂心

各一分

知母

茯苓

各三錢
三字

石膏

煨半兩

甘草

炙二錢

右剉散煎同上

小草湯治虛勞憂思過度遺精白濁虛煩不安

小草

黃耆

去蘆

當歸

去蘆酒浸

麥門冬

去心

石斛

去根各一兩

酸棗仁

人參

甘草

炙各半兩

右剉散每服三錢水一盞半生薑五片煎不以時服

神妙散治傷寒後伏暑後煩熱不安及煩熱虛勞

地骨皮

去本防風二兩

甘草

炙半兩

右剉散煎同上

清心蓮子飲治心中蘊積虛熱煩燥

方見消渴類

自汗

風證桂枝湯治傷風脈浮自汗惡風

桂枝

不見火

白芍藥

各一兩

甘草

炙半兩

右剉散每服四錢生薑五片大棗二箇煎不拘時服

發汗汗不止者謂之漏風宜加炮熱附子一兩

暑證五苓散

消暑圓

卻暑散治傷暑自汗

方並見傷暑類

濕證朮附湯治傷濕自汗

方見傷濕類

防己黃耆湯治同上

方見四氣相感類

體虛牡蠣散治諸虛不足及新病暴虛津液不固體常自汗夜卧即甚久而不止羸瘠枯瘦心忪驚惕短氣煩倦

牡蠣

米泔浸取粉

麻黃根

黃耆

知母

各一兩

右為末每服用小麥百餘粒煎湯濃調服一方為散

每三錢水三盞薤白三寸煎一盞半分三服

黃耆湯治喜怒驚恐房室虛勞致陰陽偏虛或發厥自汗或盜汗不止悉宜服之

黃耆

去蘆蜜水炙一兩半

白茯苓

去皮

熟地黃

酒蒸

肉桂

不見火

天門冬

去心

麻黃根

龍骨

各一兩

五味子

小麥

防風

去蘆

當歸

去蘆酒浸

甘草

炙各半兩

右剉散每服四錢生薑五片煎不拘時候發厥自汗

加熟附子發熱自汗加石斛未效或多喫麴食則安
撫芎湯治自汗頭眩痰逆惡心

撫芎

白朮

去油
畧炒

橘紅

各二兩

甘草

炙半兩

右剉散每服四錢生薑七片煎溫服

建中湯治表虛自汗

官桂

三分

芍藥

一兩半

甘草

炙半兩

右剉散每服四錢薑五片棗二枚食前服本方加黃
芪一兩名黃耆建中湯治虛勞自汗加當歸一兩名

當歸建中湯治婦人血虛自汗其自汗漏不止者加桂半兩熟附子半箇名桂枝附子湯每服四錢生薑七片棗子二枚空心煎服

防風散治盜汗

川芎一分

人參半分

防風二分

右為末每服一錢臨卧米飲調下

白朮散治盜汗極驗

白朮

不拘多少剉成
小塊或稍大

右用浮麥一升水一斗煮乾如白朮尚硬又加水一
二升煮取出切作片焙乾去麥不用研為末別用浮
麥湯每服二三錢不以時候

茯苓湯治虛汗盜汗

右用白茯苓為末煎烏梅陳艾湯調下二錢服之神
妙

大建中湯治虛熱盜汗百節酸疼腰痛肢體倦怠日漸
羸弱口苦舌澁心怔氣短

綿黃耆

炙

遠志

燈心 炙
去心

當歸

洗

澤瀉

各三兩

白芍藥

龍骨

人參

各二兩

甘草

炙
一兩

右剉散每服四錢水二大盞生薑五片煎熱服氣弱加炮附子二兩腰痛筋急加去麋皮官桂一兩

止汗溫粉

右用川芎白芷藁本各一分為末入米粉三分綿裹撲於身上

止汗紅粉

麻黃根

牡蠣

火煨各一兩

赤石脂

龍骨

各半兩

右為末以絹袋盛如撲粉用之

虛脫正元散治下虛手冷自汗

方見虛損類

三建湯治真陽不足上盛下虛面赤自汗小便頻數

方見

類
瘕冷

蒼附湯桂附湯治氣虛陽弱虛汗不止四體倦怠

方見瘕冷

類

虛勞麥煎散治榮衛不調夜多盜汗四肢煩痛飲食進

退肌瘦面黃

秦艽

柴胡

去苗
各二兩

大鼈甲

二兩醋煮三五沸去
裙襕別用醋徐炙黃

乾漆

炒令
煙盡

人參

茯苓

乾薑

川烏

炮去皮尖
各一兩

玄參

右為末每服二錢小麥三十粒煎湯一盞去麥入藥煎食後服如久患後亦宜服此以退其勞倦調理經絡

青蒿散治虛勞盜汗骨蒸咳嗽胸滿皮毛乾枯四肢懈

情骨節疼痛心腹驚悸咽燥唇焦頰赤煩燥涕唾腥臭
困倦少力肌體潮熱飲食減少日漸瘦弱

天仙藤

鼈甲

醋炙

香附子

炒去毛

桔梗

去蘆

柴胡

去苗

秦艽

青蒿

已上各一兩重

烏藥

半兩

甘草

炙

一兩半

川芎

二兩半

右剉散每服薑三片煎不拘時候溫服小兒骨蒸勞

熱肌瘦減食者每一錢水盞半小麥三十粒煎服

陰汗大蒜圓治陰汗濕癢

右用大蒜不以多少煨剥去皮爛研同淡豆豉末搜
圓如梧子大朱砂為衣每服三十圓棗子燈心煎湯
送下

青娥圓治同上每服五十圓酒服大效

方見虛損類

治陰汗溼癢方爐甘石一分真蚌粉半分為粉撲傳

治陰汗不止方

小安腎圓臭乾舊醬煎湯入鹽少許吞下方見虛損類

洗方蛇床子酒浸炒白礬陳醬煎水淋洗

宿食

香蘇散治宿食留飲聚積中脘噫臭腐氣心腹疼痛或

臍膈飧泄每服四錢生薑葱白烏梅煎

方見傷寒和解類

盧氏感應丸健脾進食消化宿滯酒食飽後宜服

方見諸積

類

縮砂香附湯治心腹膨滿噫宿腐氣或時冷疼

方見諸氣類

穀神丸消食健脾益氣進美飲食

人參

縮砂

香附子

炒去毛

三稜

煨

莪朮

煨

青皮

陳皮

神麴

炒

麥芽炒

枳殼炒去穰
各等分

右為末粳米糊圓梧子大每服三十圓空腹米飲吞

下鹽湯亦可

紅圓子磨化宿食止腹痛

方見痰
癰類

三稜煎圓治膨滿消食積氣塊及傷食夾臍痛甚

方見
諸氣

類

癆瘵

總說夫骨蒸痿痺復連屍疰癆疰蟲疰毒疰熱疰冷疰

食症鬼症皆曰傳屍者以症者注也病自上注下與前人相似故曰症其變有二十二種或三十六種或九十九種大畧令人寒熱盜汗夢與鬼交遺泄白濁髮乾而聳或腹中有塊或腦後兩邊有小結核連復數箇或聚或散沈沈默默咳嗽痰涎或咯濃血如肺痿肺癰狀或復下痢羸瘦困乏不自勝持積月累年以至於死死後乃症易傍人乃至滅門是也凡疾始覺精神不爽氣候不調切須戒慎酒色調節飲食如或

不然妄信邪師或言鬼祟以致不起慎之慎之又云
男女傳尸之病心胃滿悶背膊疼痛兩目不明四肢
無力雖欲寢卧卧不得寐脊脊急痛膝腦痠疼多卧
少起狀如佯病每至平旦精神尚好日午向後四肢
微熱面無顏色喜見人過常懷忿怒纔不如意又便
多嗔行立脚弱夜卧盜汗夢與鬼交或見先亡或多
驚悸有時咳嗽雖思飲食不能多餐死在須臾精神
尚好或時微利兩脇虛脹口燥鼻乾常多粘唾有時

唇赤有時欲睡漸成沈羸猶若涸魚不覺死矣

尸蟲遊食日辰及治法

大抵六蟲一旬遍遊四穴轉流周而復始具后六代法
中自立春一日後食起三日一食五日一醉歸於所
歸穴大醉五日故五日蟲醉可以下藥及灸其三日
蟲食切不可妄有醫治蟲在人身中一蟲可占十二
穴六蟲在人身中共遊七十二穴上旬十日從心至
頭遊四穴中旬從心至臍遊四穴下旬從臍至足遊

四穴上旬可先服藥後灸所遊穴其蟲頭向上若下
火灸蟲如紫蠶苗出在汗中更服藥取之以蟲盡為
度便服補藥永得安耳中旬其蟲所遊穴中頭向內
可服藥取之下旬蟲在所遊穴中頭向下亦服藥取
之不灸也恐蟲覺悟永難取蓋此蟲性已通靈務在
精審勿令有悟可也

觀尸蟲色知病淺深法

凡明醫者先須知毒氣與蟲並行政人臟腑遇陽日長

雄蟲陰日生雌蟲緣先食臟腑脂膏故其蟲色白次食血肉血肉盡故其蟲黃赤次食精髓故其蟲紫色精髓盡故其蟲黑色傳入腎中病人方死須求醫士曉達病源先取其蟲視其色理自知輕重其蟲如白色可三十日服藥補之其蟲如黃赤色可六十日服藥補之其蟲如紫黑色此疾已極可百二十日服藥補之十中可保一二雖不能為一身除害亦可為子孫除害矣服藥仍須一載之中刻意調攝方可痊平

如此得命可謂再生於世又云蟲頭赤者食患人肉
其病可治頭口白者食患人髓其病難治只得斷後
不傳子孫矣

世代傳病及諸蟲形狀

凡治病之道要須藥病相應效同神聖仍在瀉實補虛
調治臟腑方得痊愈故三尸九蟲種種靈異莫令知
之或似蜣螂或似紅絲馬尾或似蝦蟆或似刺蝟或
似鼠形或如爛麪或有足無頭或有頭無足或化精

血歸於元陽之內種種形類實難辨之淺學之流難
施方劑誤醫甚多枉死不少或則取蟲不補或則淺
學妄傳皆是徒費資財終無去病之理遂致夭折豈
不悲哉

第一代謂初勞病受其病而不測病源酒食加餐漸覺羸瘦
治療蹉跎乃至病重醫人不詳其故誤用湯藥枉而致死



此蟲在人身中如嬰兒狀背上毛長二寸



此蟲變動形如鬼在臟腑中



此蟲形如蝦蟆變動在人臟腑中

上三蟲在人身中染著之後或大或小令人夢寐顛

倒魂魄飛揚精神離散飲食不減形容漸羸四肢酸痛百節勞倦增寒壯熱背膊拘急腦與頭痛口苦舌乾面無顏色鼻流青涕虛汗常多行步艱難眼睛多痛其蟲遇丙丁日食起醉歸心膈穴中四穴輪轉周而復始大醉可醫矣取蟲出後補心當瘥

第二代為覺勞病謂傳受此疾已覺得病覺病者患乃自知夜夢不祥與亡人為伴醒後全無情思似醉神識不安所嗜食味輒成患害或則發氣動風所加四體不

和心胃滿悶日漸羸瘦骨節乾枯或嘔酸水或則醋心
唇焦口乾鼻塞腦痛背膊酸疼虛汗常出腰膝刺痛如
此疾狀須早醫治失時致傷命



此蟲如亂髮可長三寸或似守宮



此蟲形如蜈蚣在人臟腑中



此蟲形如爛麪或長或短或圓或方

上諸蟲在人身中居於腎臟透連脊骨令人思食是
物要餐身體汪羸腰膝無力髓寒骨熱四肢枯乾眼
見火生或眼多黑暗耳內虛鳴陰汗燥痒冷汗如油
夢與鬼交小便赤黃醒後昏沈臍下結硬或奔心胸
看物如艷心腹悶亂骨節疼痛其蟲遇丑亥日食起
醉歸腎臟穴四穴輪轉周而復始大醉可醫矣蟲出
後補腎填精當瘥

取蟲防護法

先令病人家用好紙糊一密室不留些罅隙尋一老
成人過遞以安息香水洒了過遞人之身又以雄黃
雌黃塗其鼻孔耳眼唇上安排鐵鉗一个布巾一幅
用香油二斤以鍋盛頸微煎令沸仍用高桶一个以
好石灰在桶内生布巾蓋桶口却服取蟲藥五更初
一服五更三點時一服服藥後腹中疼痛如刀斧劈
不妨至巳牌必須下蟲或取下臭穢如膠漆或吐瀉
膿血癥塊皆於灰桶中其蟲或從汗出些紫蠶苗狀或

於耳鼻口中出或小便中出異般形狀不止一也或青或黑或黃紅大者急用鐵鉗取於油內煎當日將油紙裹蟲入瓦罌內石灰填實埋棄於深山遠僻處免致再染人患人衣服床席並皆棄去醫人分付藥後亦須遠避

神效取蟲青桑枝飲

青桑枝

柳枝

石榴皮

桃枝

梅枝

各七莖並長四寸許

鬼臼

五錢

青蒿

一小握

赤箭

五錢

右用童子小便一升半葱白七莖去頭葉煎及一半
去滓別入安息香阿魏各一分再煎至一盞去滓調
辰砂末半錢檳榔末一分麝香一字分作二服調下
五更初一服五更三點時一服至巳時必取下蟲紅
者可救青黑不治見有所下即進軟粥飯溫煖將息
不可用性及食生冷毒物合時須擇良日不得令貓
犬孝服穢惡婦人等見一方不用鬼臼赤箭

雄黃圓

雄黃

兩半

兔糞

兩二

天靈蓋

一兩酥
炙黃

鼈甲

木香

各半
兩

輕粉

右為末法酒一升大黃半兩熬膏圓如彈子大朱砂
為衣凡此疾先燒安息香烟吸之不嗽非傳尸也不
可用此藥若烟入口咳不止乃尸也宜用此藥五更
初服勿令人知用童子小便同酒一盞化一圓服之
如人行二十里正吐出蟲或如燈心或如爛瓜李或
如蝦蟆未效再服以應為度蟲用紅火燒之又用油

煎

神授散治諸傳尸勞氣殺蟲

川椒

二斤擇去子并
合口者炒出汗

右為末每服二錢空心米湯調下須痺暈悶少頃如
不能禁即以酒糊圓如梧子大空心服三五十圓昔
人嘗與病勞婦人交婦人死遂得疾遇一異人云勞
氣已入臟遂令急服二斤其病當去如其言服之幾
盡大便出一蟲狀如蛇遂安續有人服之獲安濟者

多矣

虛證疑神飲子治勞瘵增寒發熱口乾咽燥自汗煩鬱
咳嗽聲重唾中血絲瘦劇倦乏

人參

去蘆

當歸

去尾

白芍藥

白茯苓

去木

白茯苓

黃耆

去蘆

白朮

半夏

麩

五味子

熟地黃

洗酒蒸

甘草

蓮肉

去心

大麥門冬

去心

桔梗

各等分

右剉散每服四錢水一盞半烏梅紅棗各一箇煎服

如嗽加阿膠虛極胸滿者加木香濕紙裏煨沉香亦可不思食加扁豆

劫勞散治心腎俱虛勞嗽時復三四聲遇夜發熱熱過即有盜汗四肢倦怠體瘦恍惚異夢嗽中有血名曰肺痿

白芍藥

五兩

黃耆

甘草

人參

白茯苓

熟地黄

洗酒蒸

當歸

去尾

五味子

半夏麴

阿膠

蚌粉炒各二兩

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片紅棗二枚煎
與凝神飲相類

黃耆飲子治諸虛勞氣四肢倦怠骨節酸痛潮熱乏力
自汗怔忡日漸黃瘦胃滿痞塞不思飲食咳嗽痰多甚
則唾血

黃耆

蜜炙一兩半

當歸

去蘆酒浸

紫宛

洗去土

石斛

去根

地骨皮

人參

桑白皮

赤去

附子

炮去皮臍

鹿茸

酒蒸

款冬花

各一兩

半夏

湯泡七次

甘草

炙各半兩

右劉散每服三錢生薑七片棗子一枚煎不拘時服
此藥溫補榮衛枯燥者不宜進此唾血不止者加阿
膠蒲黃各半兩

十全大補湯治虛勞發熱加北柴胡地骨皮煎
養榮湯 黃耆益損湯治同上
方見虛損類

熱證生犀散
方見前

枳殼半夏湯治嗽甚咽痛失音
方見痰飲類

溫金散治積勞咳嗽喘悶咯痰中有血

甘草

黃芩

桑白皮

防風

去蘆各一

兩

茯神

半兩

麥門冬

一分去心

杏仁

去皮尖米

泔浸一宿取出
握乾畧炒一兩

右剉散每服三錢水一盞入黃蠟一片如指頭大同

煎食後熱服

鼈甲地黃湯治熱勞手足煩心怔悸婦人血室有乾血
身體羸瘠飲食不為肌肉

柴胡

去蘆

當歸

去蘆酒浸

麥門冬

去心

鼈甲

醋炙

石斛

去根

白朮

熟地黄

酒浸焙

茯苓

去皮

秦艽

去蘆各一兩

人參

肉桂

不見火

甘草

炙各半兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片烏梅少許煎不拘時服此藥專治熱勞其性差寒脾胃快者方可服餌弱甚而多汗者不宜服

阿膠圓治勞嗽並嗽血唾血

阿膠

蛤粉炒

生地黃

洗

卷柏葉

山藥

剉炒

大蓯根

五味子

雞蘇

各一兩

柏子仁

炒別研

人參

防風

去蘆

麥門冬

去心各半兩

右為末煉蜜圓如彈子大每服一圓細嚼濃煎小麥湯或麥門冬湯嚥下

地仙散治骨蒸肌熱一切虛勞煩燥生津液

地骨皮

二兩

防風

去蘆一兩

甘草

半兩

麥門冬

一兩

去心

右剉散每服三錢水一盞生薑五片煎不拘時候黃連飲治骨節間熱積漸黃瘦

黃連

判一兩

右用童子小便一大升浸經宿微煮三四沸去滓食上分二服如人行五里再服

四美圓凡骨蒸莫非是勞脊骨尤屬腎虛髓竭也以局方

黃耆鼈甲散

沈香鼈甲散

秦艽鼈甲散

青蒿鼈甲散

四散和合為末以雄羊脊骨一具斫碎煉汁調和為

圓溫酒吞下治脊痛骨熱漸成蒸疾一劑而效其功
全在脊骨膏蓋醫者意也

通治太上混元丹河車者天地之先陰陽之祖乾坤之
橐籥鉛汞之匡廓胚臍將兆九九數足我則戴而成之
故謂之河車歷驗篇中名曰混沌皮蓋亦生天地陰陽
之始為七十二丹之首高士垂慈始開端緒太上云若
欲長生當修所生實資於此所以成功靈應非金石草
木夜露曉霜之所比倫修真之士服之不輟誠足以返

本還元補益之道真得其真

紫河車

一具用初生男子者良帶子全者以東流水洗斷血脈入麝香二錢在內以綫縫定

用生絹裏懸胎於砂瓶內入好酒五升慢火熬成膏子

沈香

朱砂

各一兩

人參

茯苓

酒浸

乳香

各二兩

白茯苓

去皮

安息香

去沙酒熬各二兩

右為末入河車膏子和藥末杵千百下圓如梧子大每服七十圓空心溫酒送下沉香湯尤佳詳此丹以紫河車為主但佐使之藥太輕無病之人久服可以

輕身延年補損扶虛乃若病重之人服之却宜增添之法也一方有天靈蓋一片酥炙黃

治男子真陽耗竭腰背疼痛自汗怔忡痰多咳喘夢遺白濁潮熱心煩脚膝無力宜於內加

鹿茸

火燎去毛酥炙

川巴戟

去心

鍾乳粉

陽起石

酒煮半日

附子

炮裂鹽水浸

黃耆

桑寄生

生鹿角

龍骨

紫苑

五味子

各一兩

右依法修製和前藥末用膏子為圓

治婦人血海虛損榮衛不足多致潮熱心煩口乾喜冷
腹脇刺痛腰腿疼痰多咳嗽驚惕怔忡經候不調或閉
斷不行宜於內加

當歸

去尾

石斛

去根

柏子仁

紫石英

醋米

淬七次

鹿茸

去毛酥炙

鼈甲

醋炙各一兩

卷柏葉

一兩

去土

川牛膝

酒浸一兩半去苗

右依法修製和前藥末膏子圓虛寒者加炮附子二
兩咳嗽者加紫苑茸二兩

治熱勞尤加

河車

依前法
修治

鼈甲

醋炙
半兩

桔梗

白芍藥

大黃

煨

甘草

苦參

貝母

知母

秋石

豉心

草龍膽

黃藥子

莪朮

煨

犀角鎔

消石

各半
兩

右為末以前膏子圓湯使如前

蘓合香圓治傳尸骨蒸殭殍肺痿症疰鬼氣心痛霍亂

時氣瘴瘧等

方見中
氣類

青蒿散治男子婦人骨蒸勞增寒壯熱

青蒿

春夏用葉秋冬用子用子不用葉用根不用莖四者相用而反以為痼疾必用童子小便

浸過使有功無毒一握

大鼈甲

炙黃醋淬五七次去腥

白朮

濕紙裹煨

熱

地骨皮

白茯苓

粉草

炙

揀參

去頭

瓜蒌根

北柴胡

去蘆

桑白皮

炙蜜

各半
兩

右為散每服三錢水一盞半煎溫服不拘時候

加減黃耆建中湯治男子婦人五勞骨蒸者世用神效

白朮

白茯苓

桔梗 各三錢

人參 三錢半

秦艽

北柴胡 去蘆

防風

白芍藥

甘草

當歸 去尾

澤瀉

生乾地黄

熟地黄

地骨皮

肉豆蔻 煨

檳榔

縮砂仁

各五錢

猪苓 四錢

黃耆 一兩

右為散每服三錢水一盞半煎溫服不拘時候老人更加黃耆一兩或為末蜜湯調服臨期斟酌

青骨散治男子婦人童男童女初覺勞瘵五心煩熱去

骨熱如神

北柴胡

生地黄

各二兩

熟地黄

人參

去蘆

防風

去蘆

秦艽

赤茯苓

各一兩

胡黃連

兩半

薄荷葉

七錢半

右剉散每服三錢水一盞半煎溫服先服荆蓬煎圓

一服微泄臟腑後服此

方見痰飲類

團魚散治骨蒸潮咳嗽累效

貝母

前胡

知母

杏仁

北柴胡

各等分

團魚二箇

右用藥同團魚煮魚熟提起去頭取肉連湯食之却將前藥焙乾為末就用團魚裙甲及骨更煮汁一盞和藥為圓如梧子大每服二十圓煎黃耆湯空心下病安仍服黃耆益損湯補理方見虛損類

蛤蚧圓治積勞咳嗽日久不差自汗口中無味

蛤蚧

一兩酥炙

款冬花

皂角

不蛀者酥炙去皮子強二片

木香

不見火

熟地黃

酒蒸焙

杏仁

去皮尖童子小便浸一晝夜曬乾蜜炙

五味子 各一兩

右為末煉蜜圓梧桐子大每服十五二十圓生薑湯送下食後臨睡服

灸法癸亥夜二更六神皆聚之時解去上體衣服於腰上兩傍微陷處謂之腰眼直身平立用筆點定然後上牀合面而卧每灼小艾炷七壯蟲或吐出或瀉下即安

又法四花穴灸見蘇沈良方及資生經效

又法膏肓肺腧穴每穴各灸九壯仍依前蟲醉日各
穴腧多灸為妙灸後百日忌煎燂生冷熱物毒食仍
戒房事避風寒減喜怒安心靜處將息若一月猶覺
未瘥於初穴上再灸

陰癰

茱萸內消圓治陰癰偏大上攻臍腹疔痛膚囊腫脹或
生瘡瘍時出黃水腰腿沈重足脛腫滿行步艱辛服之
內消不動臟腑

川棟

三兩剉炒

大腹皮

五味子

海藻

洗

玄胡索

各二兩半

茴香

炒

桂心

川烏

炮去皮臍

吳茱萸

食茱萸

桃仁

麩炒別研各一兩

木香

一兩半

桔梗

青皮

山茱萸

各二兩

兩

右為末酒糊圓梧子大每服三十圓溫酒下

木香流氣飲煎服

大戟圓治陰癰腫脹或小腸氣痛

大戟

去皮剉炒黃半兩重

葫蘆巴

四兩炒

木香

附子

炮去皮臍

舶上茴香

訶子

煨去核

檳榔

各一兩

川練

五兩後入

麝香

半錢別研

右八味為末外留川棟以好酒二升葱白七莖長三寸煮軟去皮核取肉和藥末圓如梧子大五七圓至十圓空心溫酒下薑湯亦可潮發疼痛炒薑熟酒下十五圓

煉陰丹治陰器下墜腫脹卵核偏大堅硬痛不可忍

玄胡索

微炒去殼

海藻

洗

昆布

洗

青皮

去穢

茴香

炒

川棟

核去

馬蘭花

各一兩

木香

半兩

大戟

酒浸三宿切
片焙乾一分

右為末別將礪砂阿魏安息香各一分用酒醋各一

升淘去沙石熬成膏入麝香一錢沒藥一分入前藥

和圓如菉豆大用綿灰酒下十圓至十五圓空心服

兼金圓治熱入膀胱臍腹上下兼脇筋疼痛便燥欲飲

水按之痛者

大黃

濕紙裹
煨八錢

硝石

桂心

甘草

桃仁四十箇
去皮尖

右為末煉蜜圓如梧子大每服五七圓至十圓米飲

下婦人血閉疼痛亦宜服之

應痛圓治敗精惡物不去結在陰囊成疝疼痛不可忍

久服去病

阿魏二兩醋和用蕎麥作成餅
厚三指裏阿魏慢火煨熟

檳榔大者二箇刮作麤子滿盛滴乳香將刮
下末用蕎麥麴拌作餅子慢火煨熟

右同研為末入礞砂末一錢赤芍藥末一兩同為麴

糊搜和圓梧子大每服十圓至二十圓食前溫酒鹽湯下

三白散治膀胱蘊熱風濕相乘陰癰腫脹大小便不利

白牽牛

畧炒
二兩

白朮

桑白皮

陳皮

木通

各半
兩

右為末每服空心薑湯調下初進一服未覺再進此藥不損臟氣只導利留滯疝方大率多用熱藥此方惟壅熱證宜服之

金鈴子散治膀胱疝氣閉塞下元大小便不通疼痛不可忍者服之神效分心氣飲吞青木香圓亦效

方見諸病諸氣

類

金鈴子

四十九箇去核判如豆大不得碎細用巴豆四十九箇去皮亦不得碎細同炒以金

鈴子深黃色為度去巴豆不用 茴香

一兩炒

右不用巴豆將二味為末每服二錢食前溫酒調下水出並能治之

金鈴圓治膀胱腫硬牽引疼痛及小腸氣陰囊腫毛間

金鈴子肉

五兩

茴香

炒

馬蘭花

海蛤

兔絲子

破故紙

海帶

各三兩

木香

丁香

各一兩

右為末糊圓如梧子大每服二三十圓空心食前溫酒鹽湯任下

牽牛圓治膀胱有熱服煖藥攻成壅滯作痛

黑牽牛

錢三

大黃

錢二

白礬

錢二

右用巴豆去皮三十粒先入鉚炒焦乾去巴豆入衆

藥炒香為末煨大蒜研細為圓茴香湯送下

荔枝散治腎大如斗不過二劑除根

舶上茴香 青皮全者 荔枝核

右等分剉散炒出火毒為末酒下二錢日三服

桔核圓治四種癰病

桔核炒 海藻 昆布 海帶

川棟肉各一兩 桃仁去皮尖炒一兩 厚朴薑炙

木通

枳實炒 玄胡索炒 桂心 木香各半兩

右為末酒糊圓如梧子大每服六十圓空心鹽湯酒
任下虛寒者加川烏一兩腎腫久不消加礪砂二錢
醋煮旋入有熱氣滯者加黑牽牛大黃各半兩

牡丹散治小兒卵腫偏墜

防風

牡丹皮

右等分為末每服二錢溫酒調服鹽湯亦可

竹皮湯治交接勞後陰囊腫脹痛入腹中

右刮竹青皮一升以水三升煮一半去滓分三服立

愈

灸法關元穴在臍下三寸灸三七壯

大敦穴在足大指甲後三毛上灸七壯

脚氣

陽經表散二香散治男子婦人初患脚氣其病寒熱或
頭眩忽然脚弱有筋一條自脚脛骨至臀及腰而起作
痛皆因風寒暑溼之氣相感而成先須解散每四錢加
檳榔一箇切片木瓜二片生薑三片葱白二根水二盞

煎熱服不拘時候大便秘加大黃每服半錢

方見傷寒和解類

神秘左經湯治風寒暑溼流注足三陽經手足拘攣疼痛行步艱難增寒發熱自汗惡風頭眩腰重關節掣痛或卒中昏塞大小便秘澁或腹痛嘔吐下利惡聞食氣兩腿頑麻緩縱不隨熱悶驚悸心煩氣上膈下冷痺喘滿肩息

麻黃

去節

乾葛

細辛

去蘆

厚朴

薑製

茯苓

去皮

防已

枳殼

麩炒去穰

肉桂

去皮

羌活

防風

去義

柴胡

去蘆

黃芩

小草

白薑

炮

半夏

湯洗

甘草

麥門冬

去心
各等分

右剉散每服薑三片棗一枚煎空心服自汗加牡蠣
白朮去麻黃腫滿加澤瀉木通熱甚無汗加桂加橘
皮前胡升麻腹痛吐利去黃芩加芍藥及炮附子大
便秘加大黃竹瀝喘滿加杏仁桑白皮紫蘇所加並
等分凡有此病詳認證狀逐一加減無不愈者常服

下氣消痰散風濕退腫滿諸師固秘此方雖父子兄弟不傳學者敬之

加味敗毒散治三陽經腳氣流注腳踝上焮熱赤腫寒熱如瘡自汗惡風或無汗惡寒

羌活

獨活

前胡

去蘆

柴胡

去蘆

枳殼

麩炒去穰

桔梗

去蘆

甘草

人參

茯苓

去皮

川芎

大黃

蒸

蒼朮

米泔浸

右等分剉散每服薑三片薄荷三皮煎熱服不過二

服愈皮膚搔痒赤疹加蟬蛻煎

陰經表散蘇積散以香蘇散五積散合和治證與陽經

同湯使並同未效加金鈴子木香

方見傷寒陰證和解類

加味獨活寄生湯治腎經虛弱坐卧當風著濕所得腰痛若不速治流入脚膝乃為偏枯冷痺緩弱疼重或腰攣痛脚重痺正宜服之

獨活

三兩

桑寄生

無真者續斷代

杜仲

製炒去絲

細辛

去苗

牛膝

去苗酒浸

秦艽

去心

茯苓

去皮

白芍藥

桂心

不見火

芎藭

防風

去蘆

甘草

炙

人參

熟地黄

洗蒸

當歸

去蘆各二

兩

右剉散每服四大錢水二盞煎空心服氣虛下利除地黃並治新產腹痛不得轉動及腰脚痠痺弱不得屈此方最除風消血一方有附子一箇無寄生人參甘草當歸近人將治癰瘡風並脚氣流注甚妙為圓加乳香沒藥酒服效

四蒸木瓜圓治肝腎脾三經氣虛為風寒暑濕搏著流注經絡竭日曠歲治療不痊凡遇六化更變七情不寧必至發動或腫滿或頑痺增寒壯熱嘔吐自汗

威靈仙

苦葶藶
同入

黃耆

續斷
同入

蒼朮

橘皮
同入

烏藥

去本與黃
松節同入

右各半兩以大木瓜四箇切蓋去穰入前件藥仍用蓋簪定酒洒蒸熟三蒸三嗽取藥出焙乾為末研木瓜為膏搜和搗千杵圓如梧子大每服五十圓空心

溫酒鹽湯任下世傳木瓜圓最多惟此方有效當敬之黃松節即茯苓中木

川膝煎治肝腎虛為風寒濕毒所中流注腿膝歷節疼痛如錐刀鍛刺不可名狀

大烏頭

十箇端正者槌破以紙袋盛用烏豆一斗藉覆蒸一日取出去皮尖日乾

川牛膝

二兩去蘆煨乾

右二味並不得見銅鐵氣緣肝氣惡之木臼搗碎牛膝同入石磨中磨為末酒糊圓如梧子大每服四十

圓用無灰酒一瓶中樣木瓜一箇切作片子入瓦瓶
中浸木瓜爛為度用此酒下不以時服

十全丹治脚氣上攻心腎相繫足心隱痛小腹不仁煩
渴小便或秘或利關節攣痺疼痛神效不可具述

菴蓉

酒浸

石斛

酒浸

狗脊

火去毛

萆薢

茯苓

牛膝

酒浸

地仙子

遠志

去心炒各

一兩

熟地黄

三兩酒炒

杜仲

去皮剉炒三兩

右為末煉蜜圓如梧子大每服五十圓溫酒鹽湯任

下

八味圓治少陰腎經脚氣入腹小腹不仁上氣喘急嘔吐自汗此證最急以腎乘心水尅火死不旋踵

牡丹皮

澤瀉

茯苓

各三兩

附子

炮去皮臍

桂心

各二兩

山茱萸

二兩

熟地黄

八兩

山藥

四兩

右末煉蜜圓如梧子大每服五十圓食前溫酒米湯任下

神應養真丹治厥陰肝經病邪氣進襲肝臟左癱右瘓

熱潮昏塞半身不遂手足頑麻語言蹇澁頭旋目眩牙
關緊急氣喘自汗心神恍惚肢體緩弱上攻頭目下注
脚膝體氣凝滯遍身疼痛兼治婦人產後中風角弓反
張墜車落馬打撲傷損瘀血在內

當歸酒浸

天麻

川芎

羌活

白芍藥

熟地黃

各等分一法無羌活
入木瓜炒阿膠等分

右為末煉蜜圓如雞子黃大每服一圓木瓜兔絲子
浸酒下脚痺薏苡仁浸酒下中風溫酒米湯下

乳香宣經丹治體虛為風濕寒暑襲四氣相搏半身不遂手足頑麻骨節煩疼足脛浮腫惡寒發熱漸成脚氣肝腎不足四肢攣急偏身攣注或閃肭打撲內傷筋骨及風邪內搏男子疝氣婦人經脈不調活血止痛補虛壯筋骨

葳靈仙

洗去蘆

烏藥

茴香

炒

川楝子

橘皮

牽牛子

草薢

防風

各二兩

五靈脂

乳香

各半兩

草烏

黑豆青鹽同煮竹刀切看透黑為度

去皮
半兩

右為末酒糊圓如梧子大每服五十圓鹽酒或鹽湯
下婦人食前醋湯送下

通治紫蘇子湯治脚弱上氣陰陽乖錯清濁不分上重
下虛中滿喘急嘔吐自汗無復紀律

蘇子炒

半夏洗

前胡

厚朴去皮
薑炒

甘草炙

當歸各二兩

槿心不見火

桔梗各三
兩

右剉散每服薑七片棗二枚煎食後服虛甚者加炮

附子一兩黃芪二兩

茱萸圓治脚氣入腹腹脹不仁喘悶欲死

吳茱萸

洗

木瓜

去穢切
作乾片

右等分為末酒糊圓如梧子大每服五十圓至百圓

酒或米湯任下或以木瓜蒸爛研膏為圓尤妙

蝎烏散治經年腰脚虛弱筋骨疼痛難於屈伸

全蝎

半兩

天麻

三錢

蒼朮

一兩去粗皮
炒令黃

草烏

二錢
生用

黑附子

二錢
炮去皮臍

右為末每服一大錢已用黑豆炒熟淋酒調熱服藥
氣所致麻痺少時其病隨安如骨髓中痛用胡桃去
皮研爛入酒調服凡中風亦可服此疾經年累治不
效服之如神非尋常腳氣藥比

應痛圓治寒暑風損手脚疼痛

方見正骨
科止痛類

二仙散治脚下注者因久坐久立陰濕之地當風醉脫
靴鞋皆成脚氣若暑月久立濕熱鬱蒸滯滯不和發冬
月寒氣冷麻或發疼痛悶亂晴陰皆發富貴之家亦有

此疾

蓬朮

煨一兩半

玄胡索

一兩

蛤粉

三兩

陳皮

一兩

右為末每服二錢炒黑豆五十粒以湯一盞生薑五片煎五分去滓調服用之經驗

捲栢散治遠年脚氣難治此方特效體虛人減半服

捲栢

隨用先以鹽水煮半日次用冷水煮半日焙乾東向者佳

黑牽牛

研末

甘遂

檳榔

右各為末不得相雜每服每件各一錢惟檳榔末二

錢五更初濃煎葱白湯下至辰巳時取下惡物如魚
凍隨喫淡粥病安更宜服後藥

大腹皮

三兩

乾宣木瓜

去穢二兩半

紫蘇子

微炒

檳榔

荊芥穗

烏藥

橘紅

蘇葉

各一兩

蘿蔔子

炒半兩

沈香

不見火三錢

桑白皮

炙

枳殼

去穢麤炒各一兩半

右判散每服三錢薑五片煎不以時溫服

奇方換腿丸治腎經虛弱下注腰膝或當風取涼冷氣

所乘沉重少力移步遲緩筋脈攣痛不能屈伸脚心隱痛有妨履地大治乾濕脚氣赤腫痛楚發作無時呻吟難忍氣滿喘促舉動艱難面色黧黑傳送秘澁並皆治之

薏苡仁

石南葉

各一兩

乾木瓜

四兩

肉桂

天麻

去苗

當歸

去蘆

附子

炮去皮臍

羌活

各一兩

檳榔

半兩

防風

去叉

天南星

湯洗薑汁炒

石斛

去根

草薢

炙

川牛膝

酒浸焙

黃耆

續斷

各一兩

蒼朮

米泔浸焙一兩半

右為末麪糊丸梧桐子大每服三十丸至五十丸空心溫酒或木瓜湯吞下日一二服常服舒筋輕足永無脚氣之患昔人有此病服之一月脚力頓愈委有換腿之功

石南圓治風毒脚弱少力脚重疼痺脚腫生瘡脚下隱痛不能踏地脚膝筋攣不能屈伸項背腰脊拘急不快風毒上攻頭面浮腫或生細瘡出黃赤汁或手臂少力或口舌生瘡牙齒宣爛齒搖髮落耳中蟬聲頭眩氣促心

腹脹悶小便時澁大便或難

赤芍藥

二兩

五加皮

三兩

草薢

四兩

當歸

去蘆

麻黃

去根節陳皮

赤小豆

各二兩

獨活

去蘆

薏苡仁

杏仁

去皮尖及雙仁者麤炒赤

牽牛子炒

石南葉

各二兩

木瓜

四兩

大腹皮

川芎

杜仲

剉炒各二兩

牛膝

去苗三兩

右為末以酒浸蒸餅丸梧桐子大每服十丸至十五

二十丸木瓜湯下早起日中臨卧各一服

偏風腫滿服之亦效

檳榔湯治脚氣順氣防壅

檳榔

香附子

去毛

陳皮

去白

紫蘇葉

木瓜

五加皮

粉草

各一兩

右剉散每服四錢生薑五片煎八分溫服婦人脚氣
多由血虛加當歸半兩室女脚氣多由血實加赤芍
藥一兩半大便秘結虛弱者加枳實盛者加大黃一
方治脚氣衝心大便秘宜服三和散加土烏藥春夏
常服妙

木瓜茱萸湯治脚氣入腹因悶欲死腹脹喘急

木瓜乾

大片者

檳榔

各二兩

吳茱萸

揀淨一兩湯洗七次炒

右剉散每服四錢水一盞半煎服食前用木瓜大者
二枚吳茱萸五兩湯洗七次二味並用水四碗煎至
一椀分作兩服如人行十里久再進一服或汗或吐
或瀉即瘥不拘時服

三將軍圓治脚氣入腹衝心大便不通

吳茱萸

去枝梗湯炮

宣木瓜

去穢

川大黃

各等分大黃或隨其病加減

右為末米糊圓如菰豆大每服五十圓粳米枳殼湯下末應加圓數再服以通為度

杉木節湯治腳氣入腹衝心或心脇有塊毒勝痰逆痞滿喘急汗流搐搦昏悶上視咬齒甚至垂絕不知人宜此藥以救急

杉木節

一大升

橘葉

一升無葉用皮

大腹子

十一箇連皮剉碎

右以童子小便三升煎取一升半分二服若一服得

快利停後服

木瓜牛膝圓治寒濕脚氣冷濕下注脚弱無力及腎經
虛弱腰膝沈重腿脚腫急筋脈拘攣或時疼痛步履艱
難二便不利日見倦怠

木瓜

肉蓯蓉

酒浸
炙

石楠藤

當歸

去尾

烏藥

熟地黄

杏仁

去皮尖

川牛膝

去苗

黑牽牛炒

陳皮

去白

續斷

去蘆

赤芍藥

各等

分

右為末酒糊圓梧桐子大每服三十圓空心用木瓜煎湯吞下鹽湯亦可未效用羌活木瓜浸酒或加川牛膝溫煖一盞許吞下

木通散治脚氣服熱藥太過小便不通淋閉臍下脹

當歸

梔子仁

炒

赤芍藥

赤茯苓

甘草

各一兩

右剉散每服三錢水一盞煎溫服

蒼朮散治一切風寒濕熱令足膝痛或赤腫脚骨間作

熱痛雖一點能令步履艱苦及腰膝臂髀大骨疼痛令人痿痺一切脚氣百用百效

蒼朮

米泔浸一日夜鹽炒

黃蘗

去麤皮酒浸一日夜炙焦各四兩

右剉散每服四錢水一盞煎七分溫服日進三四服
透骨丹專治脚氣

木香

一兩半 川烏煨

羌活

各一兩

白茯苓

二兩

沈香

檳榔

木瓜

川芎

乳香

別研各一兩

右為末麪糊圓如梧子大每服六十圓薑湯下

烏藥酒治脚氣發動鄉村無處問藥特效

土烏藥用乾麁布巾揩淨以瓦片刮下屑収於磁器
內以好酒一升浸一宿次日空心去藥屑止將磁器
內所浸藥酒熱湯上坐溫入生麝香少許九妙一服
即安無麝則多服服後溏泄病去

三和散脚氣稍愈常服弱人更宜末附湯壯盛人宜多
服

敗毒散

方見諸氣及傷寒陽證類

淋洗方治脚氣用此藥熏蒸淋洗

矮樟葉

石南葉

西江杉片

藿香

大蓼

獨活

白芷

紫蘇

紫金皮

藁本

羌活

各等分

右剉碎加大椒五六十粒葱一握用水二斗煎七分置盆內令病者以足加其上用厚衣蓋覆熏蒸痛處候溫熱可下手時令他人淋洗

脚氣蒸法

先以復元通氣散一方用黃芪圓倍加甘草酒糊圓
每服三十圓用淡淡酒吞下如人行五里又進一服
連進三服却用甘遂細末半兩用好醋調仍以炭三
四斤生火於地上烹至十分通紅却去火以脫底桶
子一枚或二件圍住患人足決其醋在地上急用被
絮裏蓋其足得脚上有汗為妙甚者經再取可去其
病根一方以復元通氣散並甘草先以酒服之却取

猪腰子一隻分為兩邊用甘遂末二錢頓在腰子上
用托兩脚心以片帛扎定仍濃煎甘草湯更服之又
方主脚氣流注四肢結成腫核不散赤熱炊痛及療
一切腫毒以甘遂細末醋調傳腫處濃煎甘草湯一
味服之其腫即散一服未安再用二藥須兩人各買
亦不可同處安頓及不許併手修合耳聾亦可煎甘
草湯服之以甘遂塊塞耳

脚氣塗法

猪牙皂角

擇不蛀者

大皂角

不蛀者

南木香

右各等分為末黃子醋濃調先於腫之上不腫處用藥圍塗之濶三四寸若圈然截斷毒氣不使衝上次塗下面腫處只留脚尖不塗仍修削脚甲出毒氣時時用醋潤之一方用不蛀皂角為末入平胄散內醱醋調傳一方謂倉卒祇用皂角火上燒灰存性薑汁調傳雖皆可用乃不及上方為妙

脚氣洗法

每夜用鹽塗擦腿膝至足甲淹少時却用熱湯泡洗
昔有人得脚氣諸方不效後得此春月常用淹洗不
再發

近效方

凡脚氣初作兩足伸屈之間或拘牽或痠疼或有赤
腫用香蘇散香薷散加蒼朮木瓜大蓼橘葉川椒葱
白煎水傾在盆内衣被覆足熏一時取汗再淋洗不
可頻用

灸法風市穴可令病人起正身平立垂兩臂直下舒十
指掩著兩髀便點當手中央指頭髀大筋上是

三里穴在膝頭骨節下三寸人長短大小當以病人
手尖度取灸之

絕骨穴在脚外踝上一尺亦云四寸以上三穴多灸
取效凡病一脚則灸一脚病兩脚則皆灸未效再灸
犢鼻穴在膝頭下髀上俠解大筋中以手按之得窟
解是或灸肩隅穴在肩骨骨端兩骨間陷者宛宛中

舉臂取之曲尺穴在肘外輔骨屈肘曲骨之中以手
拱胸取之足十趾端名曰氣端日灸三壯並有神效
遇間深處按
穴針之亦效

腫滿

虛證復元丹治水腫夫心腎真火能生脾肺真土今真
火氣虧不能滋養真土故土不制水水液妄行三焦不
瀉氣脈閉塞樞機不通喘息奔急水氣盈溢滲漏經絡
支膚溢滿足脛尤甚兩目下腫腿股間冷口苦舌乾心

腹堅脹不得正偃偃則咳嗽小便不通夢中虛驚不能安卧

附子

炮二兩

南木香

煨

茴香

炒

川椒

炒去汗

獨活

厚朴

去皮剉薑製炒

白朮

畧炒

陳橘皮

吳茱萸

炒

桂心

各一兩

澤瀉

一兩半

肉豆蔻

煨

檳榔

各半兩

右為末糊丸梧桐子大每服五十丸不以時紫蘇湯下此藥世傳屢驗未嘗示人其間君臣佐使與造物

同妙服者自知要當屏去諸藥一日三服先次瀉利如傾次乃腫消喘止蓋藥能助真火以養真土運動樞機安平必矣法當禁慾并絕鹽半年乃不再作禹餘糧圓治十種水氣凡脚膝腫上氣喘滿小便不利但是水氣悉皆治之

蛇黃

大者三兩以新鐵鉋盛入一秤炭火中燒蛇黃與鉋子一般通紅用鉋取鉋子出便傾蛇

黃入酸醋二升中候冷取出研極細

禹餘糧

三兩用真字關二五兩先以水淘淨烘乾更用鉋子炒乾入禹餘糧一處用米醋二升

就銚內煮醋為度却用銚研藥入一秤炭火中燒通赤傾藥淨磚地上候冷研無聲即止

以三物為主其次量人虛實入下項藥

治水多是取轉惟此方三物既非大戟甘遂芫花之比又有下項扶持故虛老人皆可服

羌活

木香

茯苓

川芎

牛膝

酒浸

白豆蔻

炮

土茴香

炒

蓬朮

炮

桂心

乾薑

炮

青皮

去穢

京三稜

炮

白茯苓

附子

炮

當歸

酒浸一宿各半兩
虛人老人用實壯

減半

右為末拌極勻以湯浸蒸餅剝去水和藥再搗極勻
丸如梧子大食前溫酒白湯任下三十圓至五十圓
唯忌鹽雖毫末許不得入口若無以為味即水病去
後且以醋少許調和食不能忌鹽勿服果欲去病切
須忌鹽但試服藥即於小便內旋去不動臟腑病去
日日三服兼以溫和調補氣血藥助之真神方也又
名萬金丹

實脾散治陰水先實脾土

厚朴

去皮薑製炒

白朮

木瓜

去穢

木香

不見火

草果仁

大腹子

附子

炮去皮臍

白茯苓

去皮

乾薑

炮各一兩

甘草

炙半兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片棗子一枚煎至七分去滓溫服不以時服

加味腎氣圓治腎虛腰重脚腫小便不利

附子

炮二兩

白茯苓

去皮

澤瀉

山茱萸

取肉

山藥炒

車前子

酒蒸

牡丹皮

去木各一兩

官桂

不見火

川牛膝

去蘆酒浸

熟地黃

各半兩

右為末煉蜜圓梧桐子大每服七十九丸空心米飲下

木香流氣飲治面目虛浮四肢腫滿喘急水道澀赤

諸氣

熱証神助散

舊名葶藶散

治十種水氣面目四肢遍身

俱腫以手按之隨手而起咳嗽喘急不得安卧腹大腫

脹口苦舌乾小便赤澀大便秘不利

澤瀉 二兩

椒目 一兩半 黑牽牛

微炒取末
二兩半

猪苓

去黑皮
二兩

葶藶

炒香入
研三兩

右剉散每服以葱白三莖漿水一盞煎至半盞入酒半盞調藥三錢絕早面向東服如人行十里久以漿水葱白煮稀粥至葱爛入酒五合熱啜量人啜多少須啜一升許不得喫鹽并麪自早至午當利小便三四升或大便利喘定腫減七分隔日再服既平之后必須大將息及斷鹽房室等三年

加味控涎圓治熱証消浮退腫下水大效

方見喘急類

疎鑿飲子治水氣通身洪腫喘呼氣急煩躁多渴大小便不利服熱藥不得者

澤瀉

赤小豆炒

商陸

羌活去蘆

大腹皮

椒目

木通

秦朮去蘆

檳榔

茯苓皮

右等分剉散每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓溫服不拘時候

通苓散治腫滿口燥咽乾小便絕少

方見傷暑類

赤小豆湯治年少血氣俱熱遂生瘡疥變為腫滿或煩或渴小便不利

商陸

赤小豆

炒

當歸

去蘆炒

澤瀉

連翹仁

赤芍藥

漢防己

木猪苓

去皮

桑白皮

炙

澤漆

已上各半兩

右剉散每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓溫服不計時候熱甚者加犀角二錢半

三仁圓治水腫喘急大小便不利

郁李仁

杏仁炮去皮尖

薏苡仁各一兩

右為末米糊丸如梧子大每服四十丸不拘時米飲

下

分心氣飲治滯氣去浮滿利凝大效

方見諸氣類

三和散和暢三焦治痞脹浮腫加赤茯苓一兩可以和

氣利水

方見諸氣類

封臍膏治水腫小便絕少

地龍

豬苓

去皮

針砂

各一兩

右為末搗葱涎調成膏敷臍中約一寸高闊絹帛束之以小便多為度日兩易

五皮散治脾水四肢頭面悉腫按之没指不惡風其腹如故不喘不渴脈不浮

大腹皮

炙

桑白皮

炙

茯苓皮

生薑皮

陳橘皮

各等分

右剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓熱服日二

三服效

一方用青木香丸每服三十五丸黑牽牛末少許新汲水調吞下二便得利效方見諸病

類

麻黃甘草湯治水腫從腰以上俱腫以此湯發汗

麻黃

去根節
四兩

甘草

二兩

右剉散每服三錢水一盞半煮麻黃再沸內甘草煎至八分取汗慎風冷有人患氣促積久不差遂成水腫服之有效但此藥發表老人虛人不可輕用更宜審察

秘傳八方芫花圓治水腫

大巴豆

二十粒
去殼

葶藶子

大黃

桂枝

芫花

杏仁

各等分

右為末米糊丸每服五十九空心溫酒吞五更早喫

下水大效

牽牛湯催發

巴豆

甘遂

各三錢

檳榔

大戟

當歸

各五錢

青皮

黑牽牛

取頭末
各一兩

右為末用一大錢葶藶子煎湯調下五更初喫下神效

葶藶散用補

木香

五錢

肉豆蔻

煨

肉葶藶

酒洗炙
各一兩

右為末每服一大錢米飲調下忌生冷油麵

烏鯉魚湯治水腫消腫及四肢腫

烏鯉魚一箇赤豆

桑白皮

白朮

陳皮

各一兩

葱白

五根

右用水三碗同煮不可入鹽先喫魚後服藥

郁李仁散治腫滿小便不利

陳皮

郁李仁

檳榔

茯苓

白朮

各一兩

甘遂

五錢

右為末每服二錢薑棗湯下

川活散治水氣腫

羌活

蘿蔔子

炒各一兩

右為末用酒調下

紅豆散緊皮

丁香

木香

各三錢

縮砂

紅豆

白薑

桂枝

陳皮

青皮

桔梗

胡椒

各五錢

右為末每服二錢秋石湯調下

紫金圓

白薑

香附子

炒去毛

紫金皮

石菖蒲

青木香

針砂

特煨紅

右各等分為末米糊圓用三十圓第一茶清下第二
商陸根湯下第三赤小豆常啖用好酒吞下秘傳方

止此

防風散治風腫皮癢麻木不仁或時疼痛

麻黃

去節

牽牛

炒

取頭末

甘草

各分半

杏仁

去皮

防風

半夏

泡

芍藥

辣桂

白芷

防己

當歸

川芎

羌活

獨活

檳榔

各一分

右剉散每服三錢薑四片蘇葉三皮煎服

茯苓散治諸氣腫等疾

芫花

醋炒

澤瀉

郁李仁

甜葶藶

漢防已

藁本

各二錢半

陳皮

白茯苓

白檳榔

瞿麥

各半兩

白滑石

大戟

各七錢半

為末每服一錢桑白皮煎湯空心調下取下碧綠水

如爛羊脂即差未盡隔日又服腫消如故不服忌鹽

百日

治脚腫方小續命湯加羌活一倍煎服之遂愈

方見風科虛証

背腫方以煉石塗之立瘥

烏梅醋法治手指甲頭腫

用烏梅槌碎去核肉只取仁研米醋調入指漬之自

愈

腮腫方以赤小豆為末傅之立效

陰腫方治男子陰腫大如升核痛人所不能治者

以馬鞭草搗爛塗之

治婦人陰腫堅硬方

枳實半斤碎炒令熟舊帛裹熨冷即易之

灸法足第二指上一寸半隨年壯又灸兩大手指縫頭
七壯治水氣通身腫滿效大衝腎腧各百壯治虛勞浮
腫效

世醫得效方卷九